

## ใบแก้อำผิด Standard Coding Guidelines 2017

**หน้า 27**

**R50**

ในกรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่า fever of unknown origin ให้รหัส ~~R50.0~~ [R50.9](#) Fever, unspecified

**หน้า 81**

ตัวอย่างที่ 5 - 3	หญิงอายุ 55 ปี เป็น atrial fibrillation ได้รับการรักษาด้วยยา warfarin มา 1 ปี มาด้วยอาการเลือดออกตามไรฟันและปัสสาวะเป็นเลือด ตรวจทางห้องปฏิบัติการพบ PT-INR 4.0 ผู้ป่วยไม่ได้รับประทานยาผิดจากที่แพทย์สั่ง		
	แพทย์สรุปจำหน่าย	Coder ให้รหัส	
การวินิจฉัยหลัก	Bleeding from warfarin	D68.3	Haemorrhagic disorders due to circulating anticoagulants
การวินิจฉัยร่วม	Atrial fibrillation	I48	Atrial fibrillation
	Deep vein thrombosis both lower legs	I80.2	Phlebitis and thrombophlebitis of other deep vessels of lower extremities
โรคแทรก	-	-	-
สาเหตุภายนอก	รับประทาน warfarin	Y44.2	Warfarin causing adverse effect in therapeutic use

**หน้า 175**

**H60**

### เกณฑ์การให้รหัส

ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่า diffuse otitis externa หรือ swimmer's ear ให้รหัส ~~H60.3 Other infective otitis externa~~ [H60.2 Malignant otitis externa](#)

ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่า acute otitis externa ให้รหัส [H60.5 Acute otitis externa, noninfective](#)

ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่า localized otitis externa หรือ furunculosis ให้รหัส [H60.0 Abscess of external ear](#)

ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่า malignant otitis externa หรือ necrotizing otitis externa ให้รหัส ~~H60.3 Other infective otitis externa~~ [H60.2 Malignant otitis externa](#) และถ้าพบร่วมกับโรคเบาหวานให้ใช้รหัสของโรคเบาหวานเป็นรหัสการวินิจฉัยร่วม

**หน้า 220**

**K10**

### เกณฑ์การให้รหัส

ให้รหัสในกลุ่ม K10.- Other diseases of jaw ตามการวินิจฉัยของแพทย์

ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่า Bisphosphonate related osteo-necrosis of jaws ให้รหัส ~~K10.88 Other specified diseases of jaw~~ [K10.28 Other specified inflammatory conditions of jaws](#) ตามด้วยรหัสสาเหตุภายนอกคือ [Y54.7 Agents affecting calcification](#)

**หน้า 281**

**M62**

### เกณฑ์การให้รหัส

ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่า rhabdomyolysis ให้รหัส ~~M62.47~~ [M62.7 Rhabdomyolysis](#) ร่วมกับรหัสของโรคที่พบด้วย เช่น renal failure และให้รหัสสาเหตุภายนอกถ้าแพทย์ระบุว่าเกิดจากยา

**หน้า 329**

ตัวอย่างที่ 35 - 15	ผู้ป่วย gestational diabetes ครรภ์ครบกำหนด คลอดปกติ แพทย์ตัดฝีเย็บ ได้ทารกเดี่ยว มีชีพ		
	แพทย์สรุปจำหน่าย	Coder ให้รหัส	
การวินิจฉัยหลัก	Spontaneous vertex delivery	O24.4	Diabetes mellitus arising in pregnancy
การวินิจฉัยร่วม	Gestational diabetes	O80.0	Single spontaneous vertex delivery
		<del>Z37.8</del> <a href="#">Z37.0</a>	Single live birth

หน้า 377

ตัวอย่างที่ 14 - 19	ผู้ป่วยรายที่แล้ว มารับการรักษา atrophic ulcer ที่มือ	
	แพทย์สรุปจำหน่าย	Coder ให้รหัส
การวินิจฉัยหลัก	Atrophic ulcer at hand	S14.3 Injury of brachial plexus L90.8 <u>Other atrophic disorders of skin</u>
การวินิจฉัยร่วม	Sequelae of right brachial plexus injury	T91.8 Sequelae of other specified injuries of neck and trunk
สาเหตุภายนอก	Sequelae of car accident	Y85.0 Sequelae of motor-vehicle accident

หน้า 381

ตัวอย่างที่ 21 - 19	ผู้ป่วยรับประทานยา rifampicin เพื่อรักษาโรค เกิด generalized drug rash แพทย์รับไว้ในโรงพยาบาล	
	แพทย์สรุปจำหน่าย	Coder ให้รหัส
การวินิจฉัยหลัก	Generalized drug rash	L27.0 Generalized skin eruption due to drugs and medicaments
การวินิจฉัยร่วม	Paracetamol poisoning	T39.1 Poisoning by 4-aminophenol derivatives
โรคแทรก	-	-
สาเหตุภายนอก	รับประทานยา rifampicin เพื่อรักษาโรค	Y40.6 Rifampicins